

Ön már találkozott bárány hasmenéssel?

A bárányok hasmenésének egyik oka lehet a kokcidiózis által okozott hasmenés.

Gyanakodhat rá, ha 3-6 hetes korú bárányaival minden tavasszal és nyáron előfordul:

- barnás-vércsíkos hasmenés
- a legjobb takarmányozás mellett is leszűrődnek bárányai

A MEGOLDÁS:

a **PURINA® OptiLamb Antikokci** bárány indító és **OptiLamb Antikokci** Bárány nevelő takarmánya.

KÖNNYÍTSE meg az életét, mert nincs állatorvosi vény, nincs élelmiszer egészségügyi várakozási idő, nincs gyógyszerköltség, nincs plusz munkaköltség!

NÖVEKVŐ GYARAPODÁS, KEVESEBB KÖLTSÉG!


Keresse Ön is forgalmazójánál vagy kérjen bővebb felvilágosítást helyi forgalmazójától, dealermenedzsereinktől vagy kérjen információt a www.purinatakarmany.co.hu oldalon.

© Cargill®, Incorporated. All Rights Reserved

Az Ön takarmányforgalmazója:



PURINA® Báránytakarmányozási program



AGRIBRANDS Europe Hungary zRt.

5300 Karcag, Madarasi út 0399. hrsz., Tel.: 59/507-221, Fax: 59/507-214

1134 Budapest, Váci út 37., Tel.: 1/236-4500, Fax: 1/236-4501

7400 Kaposvár, Dombóvári út, Tel.: 82/529-150, Fax: 82/529-160

E-mail: vevoszolgalat@cargill.com Weboldal: www.purinatakarmany.co.hu © Cargill®, Incorporated. All Rights Reserved