

PURISZELÉN-E PREMIX

Összetétel*

E vitamin	NE/kg	2.000
Szelén	mg/kg	20
EMQ	mg/kg	200
BHA	mg/kg	200

Felhasználási javaslat:

A szelén a glutation-peroxidáz enzim alkotórésze, biológiai antioxidáns hatású. Semlegesíti a takarmányokban lévő telítetlen zsírsavak oxidációjakor keletkező káros peroxidokat, s ezáltal védi az állatok sejtjeinek membránját. Az E-vitamin serkenti az antitestképződést, ezáltal javítja az állatok ellenállóképességét, gátolja a zsírok avasodását, antioxidáns hatású.

A kötött homok, meszes-vulkanikus talajokon termesztett takarmányoknak elégtelen a szeléntartalma. A szelénhiányt a takarmány magas telítetlenzsírsav-tartalma, fehérje-hiánya, mikotoxinok, peszticidek jelenléte, magas réz-, cink- és szulfáttartalom is fokozhatja. A takarmányok magas telítetlen zsírsav-tartalma pedig tönkreteszi a takarmány E-vitamin-készletét. Az E-vitamin jelentős része szárítás, raktározás közben elbomlik. A szelén és az E-vitamin hiánya következtében károsodnak a szív, a máj és a vázizomzat sejtjei, mozgásszervi és szaporodásbiológiai gondok jelentkezhetnek.

- **Sertésnél:** heveny szívhalál, szederszív-betegség, hepatitis diaetetica, MMA-szindróma, gyenge termékenyülési eredmények stb. megelőzésére, továbbá tenyészállatok takarmányához keverve célszerű alkalmazni.
- **Szarvasmarhánál** mozgásszervi zavarok (paralitikus myoglobinaemia), illetve a magzatburok-visszatartás, a magas szomatikus sejtszám, és a tőgygyulladások kialakulásának megelőzésére adható.
- **Vemhes anyajuhoknak** adva megakadályozza a bárányok szív- és vázizomelfajulásának kifejlődését.

Adagolás: 1%-ban (10 kg/tonna) a sertéstakarmányhoz adagolva annak E-vitamin tartalmát 20 mg/kg, szeléntartalmát 0,2 mg/kg értékkel növeli. Teheneknél a mozgásszervi zavarok megelőzésére legelőrehajtás körüli időszakban, a szomatikus sejtszám és a magzatburok-visszatartás csökkentésére pedig az ellés előtti 10-14 naptól a laktáció második havának végéig 50-100 g/nap adandó állatonként. Anyajuhoknak a vemhesség második harmadától a bárányok elválasztásáig kell adagolni, napi 10 g/anyajuh dózisban.

Figyelmeztetés: Túladagolása veszélyes lehet!

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap

Csomagolás: 25 kg-os négyrétegű papírzsákban.

Tárolás: száraz, hűvös helyen tárolandó.

Lejáratási idő: a gyártástól számított 6 hónap.

Cikkszám: 10000015245

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!

